

Cerebrolysin®



CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- ĐỘT QUỴ
- SA SÚT TRÍ TUỆ
- SAU CHẤN THƯƠNG,
PHẪU THUẬT THẦN KINH

Thành phần thuốc : Mỗi ml dung dịch có chứa Peptid Cerebrolysin concentrate 215,2mg, Sodium hydroxide 2,1mg, Nước cất pha tiêm vừa đủ 1ml

Chỉ định: Rối loạn trí nhớ, rối loạn độ tập trung. Sa sút trí tuệ do thoái hoá, bao gồm bệnh Alzheimer. Sa sút trí tuệ do bệnh mạch não, do nhồi máu nhiều chỗ. Sa sút trí tuệ phức hợp (cả thoái hoá và mạch máu). Đột quỵ (thiếu máu cục bộ và chảy máu). Sau chấn thương và phẫu thuật, sau chấn động, đụng dập và sau phẫu thuật thần kinh.

Liều dùng và cách dùng: Nếu liều dùng tới 5ml có thể tiêm bắp. Lớn hơn 5ml có thể tiêm tĩnh mạch hoặc truyền. Cerebrolysin có thể pha trong dung dịch chuẩn (nước muối sinh lý, dung dịch Ringer, glucose 5%, dextran 40) và truyền chậm trong vòng tối thiểu 20-60 phút. Cerebrolysin tiêm ngày một lần và trong vòng tối thiểu 10-20 ngày. Đó được coi là 1 liệu trình điều trị. Trong trường hợp nhẹ có thể dùng 1-5ml, trường hợp nặng từ 10-30ml, độ dài của thời gian điều trị và liều phụ thuộc vào tuổi của người bệnh và mức độ nặng nhẹ của bệnh. Thường thì quá trình điều trị kéo dài 3 hoặc 4 tuần. Liệu trình điều trị có thể nhắc lại vài lần và điều đó phụ thuộc vào đáp ứng lâm sàng của người bệnh. Giữa các đợt điều trị, nên nghỉ thuốc. Trong trường hợp nặng không nên

ngừng thuốc đột ngột, mà nên tiếp tục điều trị bằng cách tiêm thuốc ngày 1 lần và 2 ngày 1 lần, trong thời gian 4 tuần. Từ những thử nghiệm lâm sàng trên, hướng dẫn liều dùng cho người lớn được gợi ý như sau:

+ Sa sút trí tuệ: liều từ 5 - 30ml/24 giờ

+ Sau cơn đột quỵ ngập máu hoặc chấn thương sọ não 10 - 60ml/24 giờ

Chống chỉ định: Tăng nhạy cảm với các thành phần của thuốc. Tình trạng động kinh hoặc động kinh cơn lớn, hoặc người động kinh với tần suất động kinh tăng lên. Suy thận nặng.

Tác dụng không mong muốn: Nói chung Cerebrolysin dung nạp tốt. Nếu tiêm quá nhanh có thể gây ra cảm giác nóng. Trong một số hiếm các trường hợp tăng mẫn cảm có thể run, đau đầu hoặc tăng thân nhiệt nhẹ.

Thận trọng: Không dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận nặng, phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác thuốc: Dùng Cerebrolysin cùng với các thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc ức chế MAO có thể gây tăng tích lũy thuốc. Trong trường hợp đó nên giảm liều dùng của thuốc đó.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất: **EVER NEURO PHARMA GmbH**
Oberburgau 3, 4866 Unterach, am Attersee, Austria
Văn phòng đại diện tại:

+ **Hà Nội:** Tầng 3, 18 Trần Hưng Đạo
Tel: (84-4) 3825 1243

+ **TP HCM:** P201-203 - Lầu 11 - tòa nhà Nam á Bank - CMT8 - P4-Q3-TPHCM
Tel: (84-8) 3832 9561/62

+ **Đà Nẵng:** 79 Quang Trung
Tel: (84-511) 3833 195

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - Bộ Y Tế: 0752/15/QLD-TT, ngày 03 tháng 11 năm 2015
Visa: QLSP - 845 - 15

